

Hyperdivergence et typologie faciale

B. CANONNE

Communication affichée présentée lors des Journées de l'Orthodontie 2003

RÉSUMÉ

Matériel

50 téléradiographies en Norma Lateralis de patients ayant entre 10 et 12 ans présentant un angle FMA supérieur ou égal à 27°.

Méthode

- Réalisation de 36 mesures objectivant le degré de croissance faciale verticale antérieure et postérieure, de la divergence faciale, de la position de l'os hyoïde.
- Étude de statistiques descriptives, étude de corrélations, réalisation d'une classification ascendante hiérarchique.

Résultats

- Hauteur de l'étage inférieur de la face très augmentée (par rapport à l'étage supérieur).
- Hauteur importante du ramus et angle goniale ouvert.
- Profil convexe avec une diminution de la profondeur faciale mais aucun lien avec les anomalies sagittales.
- Croissance alvéolaire compensatrice au maxillaire.

Conclusion

Différentes caractéristiques morphologiques sont mises en évidence pourtant il ne faut pas oublier que chaque patient hyperdivergent possède une combinaison de signes spécifiques s'exprimant à des degrés divers.

MOTS CLÉS – Hyperdivergence / Croissance maxillo-faciale / Morphologie.

Pour la correspondance, s'adresser à : Bernadette Canonne, 12 A, rue d'Ouvignies, 59310 Nomain, France.