

Modification du profil cutané lors d'une correction d'une occlusion inversée antérieure chez un enfant de 18 mois

D. MIGRAINE

RÉSUMÉ

Baptiste, 18 mois, présente une occlusion inversée antérieure de ses quatre couples d'incisives, lui conférant un profil droit contrairement à celui généralement convexe d'un enfant du même âge.

Lors d'un traumatisme, la 51 a été expulsée et réimplantée immédiatement par la mère, mais en normocclusion. La 51 se retrouve donc vestibulée par rapport à ses incisives voisines, le profil gardant son aspect droit.

Nous posons un dispositif bibague scellé sur les premières molaires temporaires comprenant un fil rond acier standard 0.032 inch avec trois ressorts en 0.016 inch soudés sur l'arc pour vestibuler 52,61,62.

Neuf mois ont permis d'aligner, de vestibuler ces trois incisives et de corriger l'occlusion inversée antérieure.

Nous observons simultanément le retour à la convexité de son profil cutané.

Ce cas clinique d'interception met en évidence l'importance du type d'occlusion antérieure au moment de l'émergence des incisives. Il nous conduit à penser à la nécessité du suivi de l'enfant pendant sa croissance et ceci dès son plus jeune âge.

MOTS CLÉS – Denture temporaire / Occlusion inversée / Profil cutané / Interception.

Pour la correspondance s'adresser à : D. Migraine, 1, place Halle Dardé, 34700 Lodève.